

新型タバコ時代の禁煙支援

大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部

田淵 貴大

要 旨 日本では、加熱式タバコが急速に普及し、成人の10%以上が使うようになっています。現在得られる情報から、加熱式タバコのリスクは紙巻タバコよりも低いとは言えません。加熱式タバコを例外扱いするのではなく、タバコ規制・禁煙支援を推進していくことが求められます。

Key words : 新型タバコ, 加熱式タバコ, タバコ対策, 禁煙支援

第31回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 シンポジウムV 禁煙支援・・・我々は何を目指すのか

はじめに

第31回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会のシンポジウムでは「新型タバコ時代の禁煙支援」について報告する機会を頂き、ありがとうございました。本稿では、発表では言及できなかった新型タバコの基礎情報も含め、報告します。

新型タバコとは何か？


日本では、アイコス (IQOS) やグロー (glo) プルームテック (Ploom TECH) といった加熱式タバコが急速に普及しています¹⁾。加熱式タバコと電子タバコは、日本ではタバコの葉を用いるかどうかによって法律上の分類が異なっているだけで、タバコの葉を使っているのが加熱式タバコ、タバコの葉を使っていないのが電子タバコです。世界的には加熱式タバコは heated tobacco products、電子タバコは electronic cigarette, e-cigarette や vapor (使うことを vaping) と呼ばれます²⁾。

加熱式タバコは、従来の紙巻タバコのようにタバコ葉に直接火をつけるのではなく、タバコ葉に熱を加えてニコチン等を含んだエアロゾルを発生させる方式の新型タバコです (図1)。電子タバコでは、吸引器に溶液を入れ、コイルを巻いた加熱器で熱し、発生したエアロゾルを吸い込みます。新型タバコでは紙巻タバコと異なり、副流煙は出ませんが、呼出煙は出るため、能動喫煙および呼出煙による受動喫煙が問題となります。


加熱式タバコ

タバコの葉などを燃えない温度に加熱し、抽出されたタバコ成分を吸う

A ヒーターで加熱するタイプ (アイコスおよびグローが該当する)




B エアロゾルで抽出するタイプ (プルーム・テックが該当する)



(出典) 朝日新聞社提供の資料に加筆修正

電子タバコ

液体をヒーターで加熱し、成分を吸う



(出典) 朝日新聞社提供の資料に加筆修正

図1 加熱式タバコ・電子タバコの構造

日本が加熱式タバコの実験場

2016年10月時点で、アイコスの販売世界シェアの96%を日本が占め、最近でも日本が50%以上を占めています。すなわち、世界の中で日本がアイコスの実験場となっているのです。どれだけの人が新型タバコを使っているのでしょうか。日本在住の15歳～70歳の男女8,240人が回答

2022年8月1日受付

doi: 10.15032/jsrccr.32.138



電子タバコによる急性肺障害：e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury (EVALI)

今ある情報から確実に言えることは、まずは電子タバコ使用によって短期的に急性肺障害を発症し、死亡することがあることです。現時点では原因を特定できていませんが、新型タバコに含まれる未知の物質が原因となっている可能性もあります⁶⁾。日本では、電子タバコよりも有害だとされる加熱式タバコが流行しています。日本

タバコ会社の広告で誤解している！？

・新型タバコの影響は？

新型タバコ（加熱式タバコ及び電子タバコ）から発生
 するエアロゾルは、単なる水蒸気ではありません。加熱
 式タバコ・アイコスを使用した場合のニコチン摂取量は、
 従来の紙巻タバコと比べほぼ同等であり、発がん性物質
 であるニトロソアミンは紙巻タバコと比較すれば十分の
 一程度と少ないものの、この量が化粧品などの商品から
 検出されれば即座に回収・大問題となるレベルです^{10,11)}。
 電子タバコでも製品によるばらつきがあるものの、発が
 ん性物質であるホルムアルデヒド、アセトアルデヒドや
 アクロレイン等の有害化合物の発生が検出されていま
 す¹²⁾。電子タバコには加熱温度が非常に高く設定できる
 製品があり、そういった製品の場合には紙巻タバコより



139

も多量のホルムアルデヒドが検出されたとの報告もあります。

新型タバコのリスクを評価するために、これまでに数多く実施されてきたタバコの害に関する研究が役に立ちます。受動喫煙および喫煙本数に応じたリスクを評価する研究により、少しのタバコの煙への曝露や1日1本の喫煙でも疾患発症リスクが高いと分かっているのです(図3)¹³⁾。たいていの喫煙者は1日当たり20本のタバコを吸います(ニコチンの血中濃度を維持するために30分～1時間おきに1本のタバコを吸うようになるからです)。1日20本の人のリスクは約1.8倍(80%のリスク増)で、喫煙本数がその4分の1、1日5本の人のリスクは約1.5倍(50%のリスク増)でした。1日5本の人のリスクは、1日20本の人の約63% ($50 \div 80 \times 100 = 62.5\%$) のリスクです。喫煙本数を4分の1にしても、病気になるリスクは半分にもならないのです。


肺がんリスクの研究からも、喫煙本数が多いことよりも、喫煙期間が長いことがよりリスクを高めると分かっています^{14,15)}。喫煙本数を減らしたとしても喫煙期間が長ければ、肺がんリスクは大きいのです。さらには、呼吸器障害や循環器系障害を調べた動物実験等により加熱式タバコと紙巻タバコの有害性に差がないとする研究結果が報告されてきています。

こういった情報を総合して、加熱式タバコを吸っている人のリスクは、紙巻タバコよりも低いとは言えない、と考えられます。米国の専門家も、同意見のようです。

米国では、フィリップモリス社がアイコスを「リスク低減タバコ」として米国食品医薬品局(FDA)に申請し、フィリップモリス社が提出した科学的資料に基づき審査されました。2018年1月のFDA諮問委員会では、加熱式タバコ・アイコスが紙巻タバコに比べて、リスクが低いとは言えないと、フィリップモリス社の主張は退けられました。9人の委員のうち、8人(1人は棄権)が「紙巻タバコからアイコスに切り替えても、タバコ関連疾患リスク(病気になるリスク)を減らせない」と回答しました⁶⁾。

上記は、加熱式タバコによる能動喫煙の害について述べたものですが、受動喫煙に関しては話が複雑で、現実には起きていることに注目すべきだと考えています。新型タバコでは副流煙(吸っていない時にタバコの先端から出る煙のこと)がないため、受動喫煙は紙巻タバコと比べれば、少ないです。加熱式タバコの場合、屋内に発生する粒子状物質の濃度は紙巻タバコの数%というレベルです。しかし、受動喫煙がまったくないわけではなく、新型タバコからもホルムアルデヒドなどの有害物質が放出されます。

もともと屋内で紙巻タバコが吸われていたのを新型タバコに完全にスイッチできれば、受動喫煙の害は減らせるかもしれません。一方、もともと禁煙だった場所なのに、加熱式タバコが使われるようになるケースが続出しています。もともと自宅内ではタバコを吸わないルールだったのに、加熱式タバコならいいだろうと言って、禁



※ Pechacek TF, Babb S. BMJ 2004; 328 (7446): 980-3 より、一部改変

図3 紙巻タバコのリスク: 一日当たりの喫煙本数(横軸)と虚血性心疾患リスク(縦軸)

煙から加熱式 OK へと後退してしまうケースです。その場合にはいままでなかった受動喫煙の被害が発生してしまいます。家庭の場合、子どもや家族が受動喫煙の危険にさらされることとなります。

新型タバコ時代の禁煙

新型タバコ時代となり、「タバコを吸っていますか」と聞いただけでは新型タバコも含めた喫煙の実態が把握できなくなりました。新型タバコのことをタバコではないと回答する人がいます。

国際がん研究機関（IARC）は、科学的根拠に基づき、「タバコの煙」自体を有害物質（発がん性物質）だと判定しています。実は、これまでの50年以上にわたるタバコ煙のリスク研究全部をもってしても、タバコ煙の有害性の全容は完全には分かっていません。途中のメカニズムには不明な点もありますが、タバコの煙を吸うと、肺がん、心筋梗塞や脳卒中などの病気になってしまうと分かっています。ここで重要になる予防の観点は、途中のメカニズムがどうであろうと、とにかくタバコの煙を吸うことを防ぐことができれば、病気を防げるということです。新型タバコからも同様に「タバコの煙」が出ていると分かっています。予防すべき対象は、新型タバコも含めた、すべての「タバコの煙」だと考えられます。

新型タバコ時代の禁煙とは、新型タバコも含めてタバコをすべて止め続けることです。「禁煙し続けてもらう」のは大変なことであり、我々は禁煙支援・禁煙指導を継続的に繰り返し実施していく必要があります。親や家族に禁煙してもらうための基礎知識として、新型タバコを吸っている理由が重要だと考えています。

2018年に加熱式タバコを吸っていた680人のうち、60.6%の人が加熱式タバコを使用した理由として「他のタバコよりも害が少ないと思ったから」と回答していま

した（図4）。次に多かった理由は「タバコの煙で他人に迷惑をかけるのを避けるため」で、その次に多い理由が「友人・知人が吸っているから」でした。多くの人は、自分および他人へのタバコの害に配慮して、アイコスなど加熱式タバコを使うようになっています。一方で、加熱式タバコや電子タバコを使用した理由として、30%程度の人は「他のタバコが吸えない場所で吸うため」を挙げていました。

改正健康増進法の全面施行等により、屋内禁煙の場所が増えており、禁煙支援を進めるための良い環境整備ができています。しかし、新型タバコの登場はここにも悪影響を与えています。タバコが吸いにくくなってきた世の中だからこそ、都合よく新型タバコを吸うという人が出てきています。新型タバコを吸うようになるとその理由で吸っていなかったとしても、結果的に環境が都合よく新型タバコを吸うように仕向けていくこととなります。紙巻タバコが吸いにくい場所（環境）で新型タバコを吸うことにより、ニコチン依存が維持されやすくなってしまふのです。これからの禁煙支援では、強化されたニコチン依存という難題に立ち向かっていかなければならないのです。

新型タバコだけでなく、新型コロナ問題にも

2020年、新型コロナウイルス感染症問題が発生したことにより、今までになく、「公衆衛生」という分野が注目を集めました。従来から、社会経済的に不利な状況の者ほど医療へのアクセスが困難で、そういう人ほどタバコを吸うなど健康の社会格差が存在していますが、新型コロナ時代に健康格差は拡大したのか、緊急事態宣言などの社会政策にはどんな効果や影響があったのか、十分には実態が把握されていません。そこで、我々はJACSIS（Japan “COVID-19 and Society” Internet Survey）研究プ

	人数	%
1. 家族・親戚が吸っている（いた）から	168	24.7
2. 友人・知人が吸っている（いた）から	375	55.1
3. 加熱式タバコで仲間とコミュニケーションをとるため	117	17.2
4. 他のタバコよりも害が少ないと思ったから	412	60.6
5. 加熱式タバコのデザインや機能がよかったから	198	29.1
6. 禁煙するため	154	22.6
7. タバコの煙で他人に迷惑をかけるのを避けるため	400	58.8
8. 他のタバコが吸えない場所で吸うため	207	30.4
9. 喫煙本数を減らすため	253	37.2

出典：書籍 田淵貴大、新型タバコの本当のリスク：2019

図4 加熱式タバコを吸った理由（2018年 JASTIS 研究データ、n=680）

プロジェクトを立ち上げ、日本全国の住民約3万人を対象に健康・医療・社会・経済など生活全般に関するインターネット調査を実施しています (<https://jaccis-study.jp/>)。データをみると、緊急事態宣言が出された期間に、日本全国に薬を受け取れなかった患者がおり、感染者がほぼいない地域でも10%弱の患者がいつもの薬を切らしていたと分かりました。

新型タバコや新型コロナの問題が医療や社会、生活に与える影響が長期にわたるのは間違いありません。疫学・公衆衛生学の専門的知識・技術を駆使して、現状を把握し、対策の効果を評価し、今後のより良い医療や社会、生活のかたちに関するエビデンスを創出していきたいと考えています。疫学研究に取り組む共同研究者を広く募集しています。ともに疫学研究に取り組み、研究成果を臨床の現場、社会へと還元していきましょう。

医療者のあるべき姿を目指して、タバコ問題を自分事に

2002年に欧米の学会が発表した21世紀の医師憲章に掲げられた基本原則の一つは、『『患者の健康・幸福の追求』、すなわち、患者の健康・幸福を守ることを何よりも優先し、市場や社会からの圧力に屈してはならない』です。これをタバコ問題に当てはめれば、医療者はタバコ問題を放置しようとする様々な圧力に屈せず、患者の幸せのために禁煙支援・禁煙指導に努めなければならない、となります。喫煙はニコチン依存症であり、本人の意思だとは言えないと考えられます。もしも、医療者がタバコを吸っている患者やその家族に禁煙を勧めなければ、患者の健康・幸福を守る姿勢とは大きく乖離することになってしまいます。医療現場においても、皆さんのエフォートを禁煙支援に少しでも割いて頂き、協働して新型タバコ時代のタバコ対策に取り組んでいきたいと考えています。

※本稿は、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会のシンポジウムで発表した内容及び拙著「新型タバコの本当のリスク」等の内容に加筆・修正した内容となっております。詳細は原本をご覧ください。

著者のCOI (conflicts of interest) 開示：本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない。

Tobacco control in the era of heated tobacco products
Takahiro Tabuchi
Cancer Control Center, Osaka International Cancer Institute

文 献

- 1) Tabuchi T, Gallus S, Shinozaki T, et al.: Heat-not-burn tobacco product use in Japan: its prevalence, predictors and perceived symptoms from exposure to secondhand heat-not-burn tobacco aerosol. *Tob Control* 27(e1): e25-e33, 2018.
- 2) Glasser AM, Collins L, Pearson JL, et al.: Overview of electronic nicotine delivery systems: a systematic review. *Am J Prev Med* 52: e33-e66, 2017.
- 3) Hori A, Tabuchi T, Kunugita N: Rapid increase in heated tobacco product (HTP) use from 2015 to 2019: from the Japan 'Society and New Tobacco' Internet Survey (JASTIS). *Tob Control* 30: 474-475, 2020.
- 4) Lozier MJ, Wallace B, Anderson K, et al.: Update: demographic, product, and substance-use characteristics of hospitalized patients in a nationwide outbreak of e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injuries - United States, December 2019. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 68: 1142-1148, 2019.
- 5) Butt YM, Smith ML, Tazelaar HD, et al.: Pathology of vaping-associated lung injury. *N Engl J Med* 381: 1780-1781, 2019.
- 6) 田淵貴大：新型タバコの本当のリスク アイコス、グロー、ブルーム・テックの科学、内外出版社、東京、2019。
- 7) Aokage T, Tsukahara K, Fukuda Y, et al.: Heat-not-burn cigarettes induce fulminant acute eosinophilic pneumonia requiring extracorporeal membrane oxygenation. *Respir Med Case Rep* 26: 87-90, 2019.
- 8) Kamada T, Yamashita Y, Tomioka H: Acute eosinophilic pneumonia following heat-not-burn cigarette smoking. *Respirol Case Rep* 4: e00190, 2016.
- 9) Uchiyama S, Noguchi M, Takagi N, et al.: Simple determination of gaseous and particulate compounds generated from heated tobacco products. *Chem Res Toxicol* 31: 585-593, 2018.
- 10) Bekki K, Inaba Y, Uchiyama S, et al.: Comparison of chemicals in mainstream smoke in heat-not-burn tobacco and combustion cigarettes. *J UOEH* 39: 201-207, 2017.
- 11) Simonavicius E, McNeill A, Shahab L, et al.: Heat-not-burn tobacco products: a systematic literature review. *Tob Control* 28: 582-594, 2019.
- 12) Bekki K, Uchiyama S, Ohta K, et al.: Carbonyl compounds generated from electronic cigarettes. *Int J Environ Res Public Health* 11: 11192-11200, 2014.
- 13) Pechacek TF, Babb S: How acute and reversible are the cardiovascular risks of secondhand smoke? *BMJ* 328: 980-983, 2004.
- 14) Leffondre K, Abrahamowicz M, Siemiatycki J, et al.: Modeling smoking history: a comparison of different approaches. *Am J Epidemiol* 156: 813-823, 2002.
- 15) Flanders WD, Lally CA, Zhu BP, et al.: Lung cancer mortality in relation to age, duration of smoking, and daily cigarette consumption: results from Cancer Prevention Study II. *Cancer Res* 63: 6556-6562, 2003.